

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

### 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

#### 1.1 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Corneregel**, Οφθαλμικό διάλυμα σε μορφή γέλης (gel)

#### 1.2 ΣΥΝΘΕΣΗ:

Δραστικό συστατικό: Dexpanthenol

Έκδοχα: Cetrimide, Edetate Disodium, Sodium Hydroxide, Polyacrylic acid (carbomer), Water for injections

#### 1.3 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

Οφθαλμικό διάλυμα σε μορφή γέλης (gel)

#### 1.4 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

Κάθε gr περιέχει 50 mg Dexpanthenol.

#### 1.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Σωληνάριο των 5 gr και των 10 gr.

#### 1.6 ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Προστατευτική του επιθηλίου του κερατοειδούς.

#### 1.7 ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΑΚ):

Bausch + Lomb Ireland Limited,  
3013 Lake Drive,  
Citywest Business Campus, Dublin,  
Ιρλανδία

**Τοπικός αντιπρόσωπος του ΚΑΚ στην Ελλάδα:**

Bausch Health Hellas, Λ. Πεντέλης 53, 15235 Βριλήσσια  
Τηλ. 210 8108460

#### 1.8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ:

Dr. Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH - Γερμανίας

### 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

#### 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Corneregel περιέχει Dexpanthenol, ουσία που in vitro συμβάλλει στην προστασία και πιθανά στην επούλωση του επιθηλίου του κερατοειδούς.

## **2.2 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Υποβοηθητικό στη θεραπευτική αντιμετώπιση των επιφανειακών βλαβών του κερατοειδούς με την παροχή προστασίας και λίπανσης του.

## **2.3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό του σκευάσματος.

## **2.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

### 2.4.1 Γενικά

### 2.4.2 Ηλικιωμένοι

-

### 2.4.3 Κύηση

Η χρήση του φαρμάκου θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης, παρόλο που δεν υπάρχουν ενδείξεις εμβρυοτοξικότητάς του.

### 2.4.4 Γαλουχία

Η χρήση του φαρμάκου θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια του θηλασμού, παρόλο που δεν υπάρχουν ενδείξεις εμβρυοτοξικότητάς του.

### 2.4.5 Παιδιά

-

### 2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Επειδή, ακόμα και όταν το φάρμακο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθούν διαταραχές στην οπτική οξύτητα/όραση, αμέσως μετά την ενστάλαξή του, επιστάται προσοχή κατά την οδήγηση οχημάτων και τον χειρισμό μηχανημάτων.

### 2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα

-

## **2.5 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ**

Καμιά γνωστή έως σήμερα.

## **2.6 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ**

Ανάλογα με τη βαρύτητα και την ένταση των συμπτωμάτων, ενστάλαξη μιας (1) σταγόνας στον κάτω επιπεφυκοτικό θύλακα, 3-5 φορές, ή και περισσότερο, κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς και πριν από την νυχτερινή κατάκλιση.

## 2.7 ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

## 2.8 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

## 2.9 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΟΣΗ

Εάν το φάρμακο λαμβάνεται σε τακτές δόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και παραλείψετε μία από αυτές, τότε πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή αμέσως. Εάν όμως έχει περάσει πολύς χρόνος και πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, τότε μη λάβετε τη δόση που χάσατε, αλλά συνεχίστε το πρόγραμμά σας κανονικά.

## 2.10 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φάρμακο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης του. Πετάξτε οποιοδήποτε υπόλειμμα του προϊόντος 4 εβδομάδες μετά το άνοιγμα του περιέκτη.

## 2.11 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μη εφαρμόσιμες.

## 2.12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

31.03.2022

## 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (γενικά)

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας για το συγκεκριμένο ιατρικό πρόβλημά σας. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που χρησιμοποιείτε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα, μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

- Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- Να μη κρατάτε φάρμακα που δε τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

#### **4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ**

«Χωρίς ιατρική συνταγή»

Σε περίπτωση που θεωρείται ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, [www.eof.gr](http://www.eof.gr))